
عناصر الإجابة: (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول: (07 نقاط)		
-I		
1) إيجاد الصيغة المجملة للمركب A:		
A: $C_nH_{2n}O$	0,25	
$M_A = d \times 29 = 1,52 \times 29 = 44,08\ g.mol^{-1}$	0,25	**01,00**
$12n+2n+16=44 \Rightarrow n=\frac{44-16}{14}=\boxed{2}$	0,25	
$A : C_2H_4O$	0,25	
2) الصيغة نصف المفصلة للمركب A.		
$A : CH_3-C(=O)-H$	0,50	**00,50**
-II		
1) إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات: من B إلى المركب N		
B $CH_3-CH(OMgCl)-CH_3$ C $CH_3-CH(OH)-CH_3$ D $CH_3-CH(Cl)-CH_3$	13 x 0,25	**03,25**
E $CH_3-CH(MgCl)-CH_3$ F $CH_3-CH(CH_3)-C(=O)-OMgCl$ G $CH_3-CH(CH_3)-C(=O)-OH$		
H $CH_3-CH(CH_3)-C(=O)-Cl$ I $C_6H_5-C(=O)-CH(CH_3)-CH_3$ J $C_6H_5-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$		
K $CH_3-C(=O)-OH$ L $CH_3-C(=O)-Cl$		
M $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-C_6H_4-C(=O)-CH_3$ N $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-C_6H_4-CH(OH)-CH_3$		
2) الوسيط المستعمل في التفاعلين رقم 8 و 12: $AlCl_3$	0,25	**00,25**

3) مماكبات الضوئية للمركب N بإسقاط فيشر:



2 x 0,25 = **00,50**

4) أ- معادلات التفاعل المؤدية للمركب Q و البوليمير P:

$$CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3 \xrightarrow[170\ ^oC]{H_2SO_4} CH_3-CH=CH_2 + H_2O$$

0,50

$$n\ CH_3-CH=CH_2 \longrightarrow P\left[\ -\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_2-\ \right]_n \quad (Q)$$

0,50 — **01,50**

ب- مقطع من البوليمير P يتكون من ثلاث وحدات بنائية:

$$\cdots\cdots-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_2-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_2-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_2-\cdots\cdots$$

0,50

التمرين الثاني:(07 نقاط)

I- ملاحظة: يمكن كتابة ثنائي الغليسريد A بالرمز DG

1) حساب الكتلة المولية لثنائي الغليسريد A:

$$1\ mol\ de\ A \longrightarrow 2\ mol\ de\ KOH$$

$$\left.\begin{array}{l} M_A \longrightarrow 2\times 56,1\ de\ KOH \\ 1g \longrightarrow I_S\times 10^{-3} \end{array}\right\} \Rightarrow M_A = \frac{2\times 56,1}{209,3\times 10^{-3}} = \boxed{536\ g.mol^{-1}}$$

0,25 — 0,25 — **00,25**

2) أ- حساب الكتلة المولية للحمض الدهني المشبع B:

$$n_B = n_{NaOH}$$

$$n_{NaOH} = C_{NaOH}\times V_{NaOH} = 0,5\times 10\times 10^{-3} = 5\times 10^{-3} mol$$

0,25

$$n_B = \frac{m_B}{M_B} \Rightarrow M_B = \frac{m_B}{n_B} = \frac{1}{5\times 10^{-3}} = \boxed{200\ g.mol^{-1}}$$

0.25

ب- استنتج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني المشبع B:

$$CH_3-(CH_2)_X-COOH$$

0,25

$$15 + 14x + 45 = 200 \Rightarrow x = \frac{200-60}{14} = 10$$

$$\boxed{CH_3-(CH_2)_{10}-COOH}$$

0,25 — **01,00**

كما تقبل الإجابة:

B: $C_nH_{2n}O_2$

$M_B = 12n + 2n + 32 = 200$

$n = \frac{200 - 32}{14} = 12$ $\boxed{CH_3\text{-}(CH_2)_{10}\text{-}COOH}$

3) الحمض الدهني C يرمز له بـ $C\mathbf{n}:2\Delta^{9,12}$

أ- عدد ذرات الكربون في الحمض الدهني C :

$A + 2H_2O \rightarrow Glycérol + B + C$

$M_A = 536\ g.mol^{-1}$

$M_{Glycérol} = (3\times12) + (8\times1) + (3\times16) = 92\ g.mol^{-1}$

$M_B = 200\ g.mol^{-1}$

$M_A + 2M_{H_2O} = M_{Glycérol} + M_B + M_C$

$M_C = M_A + 2M_{H_2O} - M_{Glycérol} - M_B$

$M_C = 536 + (2\times18) - 92 - 200 = 280\ g.mol^{-1}$

C: $C_nH_{2n-4}O_2$

$12n + 2n - 4 + 32 = 280$

$n = \frac{280 - 28}{14} = 18$ $\boxed{n = 18}$

01,25 — 0,25

ب- استنتاج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني C:

0,25

$CH_3{-}(CH_2)_4{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH{=}CH{-}(CH_2)_7{-}COOH$


جـ- كتابة تفاعل أكسدة الحمض الدهني C بـ $KMnO_4$ المركزة و في وسط H_2SO_4:

3 x 0,25

$CH_3\text{-}(CH_2)_4{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH{=}CH{-}(CH_2)_7{-}COOH \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4}$

$CH_3{-}(CH_2)_4{-}COOH$ + $HOOC{-}CH_2{-}COOH$ + $HOOC{-}(CH_2)_7{-}COOH$

4) كتابة الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسريد A:



3 x 0,25 — **00,75**

5) حساب قرينة اليود I_i لثنائي الغليسريد A:

$$1\ mol\ de\ A \longrightarrow 2\ mol\ de\ I_2$$

$$\left.\begin{array}{l} M_A \longrightarrow 2\,M_{I_2} \\ 100\ g \longrightarrow I_I \end{array}\right) \Rightarrow I_I = \frac{2\times 254\times 100}{536} = \boxed{94,77}$$

0,25 — **00,25**

-II

1) تصنيف الأحماض الأمينية:


Ala حمض أميني خطي بسيط

Asp حمض أميني خطي حامضي

Tyr حمض أميني عطري

3 x 0,50 — **01,50**

2) أ- كتابة صيغ المركبات A, B, C:



A B C

3 x 0,25


ب- حساب قيمة الـ pHi للحمض الأميني التيروزين:

$$pH_i = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{2,2+9,11}{2} \quad \boxed{pH_i = 5,65}$$

2 x 0,25 — **01,25**

3) أ- كتابة الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الببتيد Ala-Asp-Tyr


0,25



ب -


- صيغة Ala-Asp-Tyr عند pH= 1

0,25



- صيغة Ala-Asp-Tyr عند pH= 13

0,25



00,75

التمرين الثالث: (06 نقاط)

1) أ- حساب كمية الحرارة Q الناتجة عن احتراق كتلة البروبان الغازي:

$$\sum Q = Q_{comb} + Q_{eau} = 0$$

0,25 $$\sum Q = Q_{comb} + mc_e\Delta T = 0 \Rightarrow Q_{comb} = -mc_e\Delta T$$

$$Q_{comb} = -723\times4,185\times22$$

0,25 $$\boxed{Q_{comb} = -66566,6\ J}$$

ب- قيمة أنطالبي احتراق البروبان الغازي:

0,25 $$n = \frac{m}{M} = \frac{1.32}{44} = 0.03\ mol$$

0,50 $$\Delta H^{\circ}_{comb} = \frac{Q_{comb}}{n} = -\frac{66566.6}{0.03} = \boxed{-2218.88\ kJ.mol^{-1}}$$

جـ- كتابة معادلة الإحتراق التام للبروبان الغازي:

02,50 | 0,50

$$C_3H_{8(g)} + 5O_{2(g)} \longrightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(\ell)}$$

د- حساب أنطالبي تشكل البروبان الغازي:

$$\Delta H^\circ_{comb} = \sum \Delta H^\circ_{produits} - \sum \Delta H^\circ_{reactifs}$$

0,25

$$\Delta H^\circ_{comb} = 3\Delta H^\circ_f\left(CO_{2(g)}\right) + 4\Delta H^\circ_f\left(H_2O_{(\ell)}\right) - \Delta H^\circ_f\left(C_3H_{8(g)}\right) - 5\Delta H^\circ_f\left(O_{2(g)}\right)$$

$$\Delta H^\circ_f\left(C_3H_{8(g)}\right) = 3\Delta H^\circ_f\left(CO_{2(g)}\right) + 4\Delta H^\circ_f\left(H_2O_{(\ell)}\right) - \Delta H^\circ_{comb} - 5\Delta H^\circ_f\left(O_{2(g)}\right)$$

0,25

$$\Delta H^\circ_f\left(C_3H_{8(g)}\right) = 3(-393) + 4(-286) - (-2218,8) - (5\times 0)$$


$$\Delta H^\circ_f\left(C_3H_{8(g)}\right) = -1179 - 1144 + 2218,8$$

0,25

$$\boxed{\Delta H^\circ_f\left(C_3H_{8(g)}\right) = -104,2\ kJ.mol^{-1}}$$

2) حساب أنطالبي تشكل البروبان الغازي من خلال طاقات الروابط:

0,50



01,25

0,25

$$\Delta H^\circ_f\left(C_3H_{8(g)}\right) = 3\Delta H^\circ_{sub(C)} + 4\Delta H^\circ_{d(H-H)} - 2\Delta H^\circ_{d(C-C)} - 8\Delta H^\circ_{d(C-H)}$$

$$\Delta H^\circ_f\left(C_3H_{8(g)}\right) = (3\times 717) + (4\times 436) - (2\times 348) - (8\times 413)$$

$$\Delta H^\circ_f\left(C_3H_{8(g)}\right) = 2151 + 1744 - 696 - 3304$$

0,25

$$\boxed{\Delta H^\circ_f\left(C_3H_{8(g)}\right) = -105\ kJ.mol^{-1}}$$

0,25

القيمتان $-105\ kJ.mol^{-1}$ و $-104,2\ kJ.mol^{-1}$ لـ $\Delta H^0_f\left(C_3H_{8(g)}\right)$ متقاربتان

3) أ- استنتاج أنطالبي هدرجة البروبن الغازي ΔH_3^0 :

$$C_3H_7Cl_{(\ell)} + H_{2(g)} \longrightarrow C_3H_{8(g)} + HCl_{(g)} \quad \Delta H_1^\circ = -52\ kJ.mol^{-1}$$

0,25 $$C_3H_{6(g)} + HCl_{(g)} \longrightarrow C_3H_7Cl_{(\ell)} \quad \Delta H_2^\circ = -72\ kJ.mol^{-1}$$

$$C_3H_{6(g)} + H_{2(g)} \longrightarrow C_3H_{8(g)} \quad \Delta H_3^\circ = \Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ$$

0,25 $$\boxed{\Delta H_3^\circ = -124\ kJ.mol^{-1}}$$

ب- حساب أنطالبي تشكل كلور البروبان السائل $\Delta H_f^\circ\left(C_3H_7Cl_{(\ell)}\right)$.

$$\Delta H_r^\circ = \sum \Delta H_{produits}^\circ - \sum \Delta H_{reactifs}^\circ$$

0,25 $$\Delta H_1^\circ = \Delta H_f^\circ\left(C_3H_{8(g)}\right) + \Delta H_f^\circ\left(HCl_{(g)}\right) - \Delta H_f^\circ\left(C_3H_7Cl_{(\ell)}\right) - \Delta H_f^\circ\left(H_{2(g)}\right)$$

$$\Delta H_f^\circ\left(C_3H_7Cl_{(\ell)}\right) = \Delta H_f^\circ\left(C_3H_{8(g)}\right) + \Delta H_f^\circ\left(HCl_{(g)}\right) - \Delta H_1^\circ - \Delta H_f^\circ\left(H_{2(g)}\right)$$

0,25 $$\Delta H_f^\circ\left(C_3H_7Cl_{(\ell)}\right) = -104,1 - 92 + 52 \Rightarrow \boxed{\Delta H_f^\circ\left(C_3H_7Cl_{(\ell)}\right) = -144,1\ kJ.mol^{-1}}$$


ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة إستعمال $\Delta H_f^\circ\left(C_3H_{8(g)}\right) = -105\ kJ.mole^{-1}$

وتكون النتيجة $\boxed{\Delta H_f^\circ\left(C_3H_7Cl_{(\ell)}\right) = -145\ kJ.mol^{-1}}$

02,25

ج- حساب أنطالبي تفكك الرابطة C-Cl $\left(\Delta H_{d(C\text{-}Cl)}^\circ\right)$:

0.50



0,25 $$\Delta H_{f\left(C_3H_7Cl_{(\ell)}\right)}^\circ = \left[3\Delta H_{sub(C)}^\circ + \frac{7}{2}\Delta H_{d(H\text{-}H)}^\circ + \frac{1}{2}\Delta H_{d(Cl\text{-}Cl)}^\circ\right] - \left[2\Delta H_{d(C\text{-}C)}^\circ + 7\Delta H_{d(C\text{-}H)}^\circ + \Delta H_{d(C\text{-}Cl)}^\circ + \Delta H_{vap\left(C_3H_7Cl\right)}^\circ\right]$$

$$\Delta H_{f\left(C_3H_7Cl_{(\ell)}\right)}^\circ = 3\Delta H_{sub(C)}^\circ + \frac{7}{2}\Delta H_{d(H\text{-}H)}^\circ + \frac{1}{2}\Delta H_{d(Cl\text{-}Cl)}^\circ - 2\Delta H_{d(C\text{-}C)}^\circ - 7\Delta H_{d(C\text{-}H)}^\circ - \Delta H_{d(C\text{-}Cl)}^\circ - \Delta H_{vap\left(C_3H_7Cl\right)}^\circ$$

0,25 $-144,1 = (3\times717) + (\frac{7}{2}\times436) + (\frac{1}{2}\times242) - (2\times348) - (7\times413) - \Delta H^{\circ}_{d(C-Cl)} - 27$

$\Delta H^{\circ}_{d(C-Cl)} = 2151 + 1526 + 121 - 696 - 2891 + 144,1 - 27$

0,25 $\boxed{\Delta H^{\circ}_{d(C-Cl)} = 328,1\ kJ.mol^{-1}}$





وتقبل أيضا:

$-144,1 = (3\times717) + (\frac{7}{2}\times436) + (\frac{1}{2}\times242) - (2\times348) - (7\times413) - \Delta H^{\circ}_{d(C-Cl)} - 27$

$\Delta H^{\circ}_{d(C-Cl)} = 2151 + 1526 + 121 - 696 - 2891 + 145 - 27$

$\boxed{\Delta H^{\circ}_{d(C-Cl)} = 329\ kJ.mol^{-1}}$


انتهى تصحيح الموضوع الأول

عناصر الإجابة (الموضوع الثانـي)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول(07 نقاط):		
I- ايجاد الصيغ نصف المفصلة للمركّبات A ، B ، C ، D ، E ، F:		
	6 x 0,50	**03,00**
		
II- إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركّبات (G)، (H) ، (I) ،(J):		
	3 x 0,50	**01,50**
III- أ- نوع البلمرة : بلمرة بالتكاثف.	0,50	
ب- مقطع من وحدتين بنائيتين للبوليمير:		
	0,50	
جـ- حساب الكتلة المولية المتوسطة للبوليمير:		**02,50**
$M_p = n \times M_m$	0,50	
$M_m = M(C_{14}H_{10}O_2N_2)$	0,25	
$M_m = 12\times14+10+32+28 = 238 g.mol^{-1}$	0,50	
$M_p = 800\times238 = \boxed{190400 g.mol^{-1}}$	0,25	

التمرين الثاني (06 نقاط):


I- ملاحظة: يمكن كتابة ثنائي الغليسريد A بالرمز DG


1) معادلة تفاعل أكسدة حمض الأراشيدونيك:





3 x 0,25 — **00,75**

2) الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسيريد:









3 x 0,25 — **00,75**

3) حساب قرينة اليود (I_i) لثنائي الغليسيريد A:

$$A + 2H_2O \longrightarrow Glycérol + C16:0 + C20:4\Delta^{5,8,11,14}$$

$$M_A + 2M_{H_2O} = M_{Glycérol} + M_{(C20:4\Delta^{5,8,11,14})} + M_{(C16:0)}$$

$$M_{C16:0} = 15 + (14\times14) + 45 = 256\ g.mol^{-1}$$

$$M_{(C20:4\Delta^{5,8,11,14})} = (12\times20)+32+32 = 304\ g.mol^{-1}$$

$$M_A = M_{Glycérol} + M_{(C20:4\Delta^{5,8,11,14})} + M_{(C16:0)} - 2M_{H_2O}$$

00,50 0,25 $M_A = 92+304+256-(2\times18)$ $\boxed{M_A = 616\ g.mol^{-1}}$

- **ملاحظة:** تقبل الإجابة التالية لحساب M_A

$$\boxed{\begin{array}{l} A: C_{39}H_{68}O_5 \\ M_A = 39\times12+16\times5+68 = 616\ g.mol^{-1} \end{array}}$$

0,25

$$\left.\begin{array}{l} A \longrightarrow 4 \times I_2 \\ 616 \longrightarrow 4 \times 254 \\ 100\ g \longrightarrow Ii \end{array}\right\} \Longrightarrow Ii = \frac{4x254x100}{616} = \boxed{164,93}$$

4) قيمة قرينة التصبن I_s لثنائي الغليسيريد A .

00,25 0,25

$$\left.\begin{array}{l} 1\ mol\ de\ A \longrightarrow 2\ mol\ de\ KOH \\ 616 \longrightarrow 2\times56,1\ de\ KOH \\ 1g \longrightarrow I_S\times10^{-3} \end{array}\right) \Rightarrow I_S = \frac{1\times2\times56,1}{616\times10^{-3}} = \boxed{182,14}$$

-II

1) أ- تصنيف الأحماض الأمينية :

3 x 0,50 **02,00**


Glu: حمض أميني خطي حامضي.

Ser: حمض أميني خطي هيدروكسيلي.

Asn: حمض اميني خطي أميدي.


ب- كتابة الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الببتيد Ser-Asn-Glu:

0,50



2) أ- كتابة الصيغ الأيونية لـ A , B , C:

3 x 0,25



ب- حساب قيمة الـ pHi :

2 x 0,25


$$pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_2}{2}$$

$$pH_i = \frac{2,02 + 8,8}{2} = \boxed{5,41}$$

01,75

جـ- الصيغ الأيونية المتواجدة عند pH=8 هي:

2 x 0,25



التمرين الثالث (07 نقاط):

1) أ- موازنة معادلة تفاعل احتراق الغليسين الصلب s(Gly):

4 x 0,25

$$NH_2-CH_2-COOH_{(s)} + \frac{9}{4}O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + \frac{5}{2}H_2O_{(\ell)} + \frac{1}{2}N_{2(g)} \quad \Delta H^o_{comb}$$

ب- حساب ΔH^o_{comb} أنطالبي تفاعل الاحتراق عند 25°C:

بتطبيق قانون هيس:

0,25 $$\Delta H^o_{comb} = \sum \Delta H^o_f(produits) - \sum \Delta H^o_f(reactifs)$$

0,25 $$\Delta H^o_{comb} = \left[2\times\Delta H^o_f(CO_{2(g)}) + \frac{5}{2}\times\Delta H^o_f(H_2O_{(\ell)}) + \frac{1}{2}\times\cancel{\Delta H^o_f(N_{2(g)})} \right]$$

$$- \left[\Delta H^o_f(Gly_{(s)}) + \frac{9}{4}\times\cancel{\Delta H^o_f(O_{2(g)})} \right]$$

0,25 $$\Delta H^o_{comb} = \left[2\times(-393) + \frac{5}{2}\times(-286) \right] - (-527,5)$$

0,25 $$\Delta H^o_{comb} = \boxed{-973,5\ kJ.mol^{-1}}$$

02,75

جـ- إيجاد كمية الحرارة الناتجة عن احتراق 7,5g من الغليسين احتراق تام عند 25°C:

0,25 $M_{Gly} = 16 + 14 + 32 + 13 = 75 g.mol^{-1}$

0,25 $\begin{cases} M_{Gly} = 75 \longrightarrow \Delta H_{comb} = -973,5\ kJ \\ m = 7,5 \longrightarrow \quad Q = ? \end{cases}$

0,25 $Q = \dfrac{7,5 \times (-973,5)}{75} = \boxed{-97,35\ kJ}$

ملاحظة: تقبل الإجابة التالية:

$$\boxed{\begin{array}{l} M_{Gly} = 16 + 14 + 32 + 13 = 75 g.mol^{-1} \\ \Delta H^{o}_{comb} = \dfrac{Q}{n} \Rightarrow n = \dfrac{m_{(Gly)}}{M_{(Gly)}} = \dfrac{7,5}{75} = 0,1 mol \\ Q = \Delta H^{o}_{comb} \times n = -973,5 \times 0,1 = -97,35 kJ \end{array}}$$

2) حساب أنطالبي التفاعل السابق عند 60°C بتطبيق قانون كيرشوف:

0,50 $\Delta H^{o}_{T} = \Delta H^{o}_{T_0} + \int_{T_0}^{T} \Delta C_p dT \quad , \quad \Delta H^{o}_{333} = \Delta H^{o}_{298} + \int_{298}^{333} \Delta C_p dT$

01,75

0,25 $\Delta H^{o}_{333} = \Delta H^{o}_{298} + \Delta C_p (333 - 298)$

0,25 $\Delta Cp = 2Cp(CO_{2(g)}) + \frac{5}{2}Cp(H_2O_{(\ell)}) + \frac{1}{2}Cp(N_{2(g)}) - \frac{9}{4}Cp(O_{2(g)}) - Cp(Gly_{(s)})$

0,25 $\Delta C_p = (2 \times 37,45) + \left(\frac{5}{2} \times 75,24\right) + \left(\frac{1}{2} \times 29,12\right) - \left(\frac{9}{4} \times 29,37\right) - (99,20)$

0,25 $\Delta C_p = 112,27\ J.mol^{-1}.K^{-1}$

0,25 $\Delta H^{o}_{333} = -973,5 + \left(112,27 \times 10^{-3}\right)(333 - 298) = -969,58\ kJ.mol^{-1}$

3) إيجاد أنطالبي تشكل الغليسين الغازي $\Delta H^{\circ}_{f}(Gly)_g$:

$Gly(s) \longrightarrow Gly(g) \quad \Delta H^{\circ}_{sub}(Gly) = 147\ kJ.mol^{-1}$


00,50

0,25 $\Delta H^{\circ}_{sub}(Gly) = \Delta H^{\circ}_{f}(Gly)_{(g)} - \Delta H^{\circ}_{f}(Gly)_{(s)}$

$\Delta H^{\circ}_{f}(Gly)_{(g)} = \Delta H^{\circ}_{f}(Gly)_{(s)} + \Delta H^{\circ}_{sub}(Gly)$

0,25 $\Delta H^{\circ}_{f}(Gly)_{(g)} = -527,5 + 147 = \boxed{-380,5 kJ.mol^{-1}}$

4) حساب أنطالبي تفكك الرابطة (C-N) في الغليسين $\Delta H^{\circ}_{d(C-N)}$:



02,00

0,50

0,25 $\sum \Delta H^{o}_{d} = \Delta H^{o}_{d}(C\text{-}C) + 2\Delta H^{o}_{d}(C\text{-}H) + 2\Delta H^{o}_{d}(N\text{-}H) + \Delta H^{o}_{d}(C\text{-}N)$

$+ \Delta H^{o}_{d}(C{=}O) + \Delta H^{o}_{d}(C\text{-}O) + \Delta H^{o}_{d}(O\text{-}H)$

0,25 $\Delta H^{o}_{d}(C\text{-}N) = \sum \Delta H^{o}_{d} - \left(\Delta H^{o}_{d}(C\text{-}C) + 2\Delta H^{o}_{d}(C\text{-}H) + 2\Delta H^{o}_{d}(N\text{-}H)\right)$

$- \left(\Delta H^{o}_{d}(C{=}O) + \Delta H^{o}_{d}(C\text{-}O) + \Delta H^{o}_{d}(O\text{-}H)\right)$

0,25 $\Delta H^{o}_{f}(Gly)g = 2\Delta H^{o}_{sub}(C_{(s)}) + \frac{5}{2}\Delta H^{o}_{d}(H\text{-}H)$

$+ \Delta H^{o}_{d}(O{=}O) + \frac{1}{2}\Delta H^{o}_{d}(N \equiv N) - \sum \Delta H^{o}_{d}$

0,25 $\sum \Delta H^{o}_{d} = \left(2\Delta H^{o}_{sub}(C_{(s)}) + \frac{5}{2}\Delta H^{o}_{d}(H\text{-}H) + \Delta H^{o}_{d}(O{=}O) + \frac{1}{2}\Delta H^{o}_{d}(N \equiv N)\right) - \Delta H^{o}_{f}(Gly)g$

0.25 $\sum \Delta H^{o}_{d} = \left(2 \times 717 + \frac{5}{2} \times (436) + (498) + \frac{1}{2}(940)\right) - (-380,5)$

$\sum \Delta H^{o}_{d} = 3872,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$

$\Delta H^{o}_{d}(C\text{-}N) = 3872,5 - \left((348) + 2(413) + 2(391)\right) - \left((810) + (351) + (463)\right)$

0,25 $\boxed{\Delta H^{o}_{d}(C\text{-}N) = 292,5 \text{ kJ.mol}^{-1}}$

انتهى تصحيح الموضوع الثاني