الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2011

المادة : الرياضيات الشعبة: رياضيات

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
أعداد مركبة وتطبيقاتها الهندسية التشابه	**التمرين الأول** : (04.5 نقطة)		04.5
	1) $z_A=\sqrt{2}e^{-\frac{i\pi}{4}}$ ، $z_B=\sqrt{2}e^{\frac{i3\pi}{4}}$ ، $z_C=\sqrt{6}e^{\frac{i\pi}{4}}$	0.5×3	
	2) أ- $\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ و $\left\lvert\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}\right\rvert=1$ و $\arg\left(\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}\right)=\frac{\pi}{3}+2k\pi;k\in\mathbb{Z}$	0.25×3	
	التفسير الهندسي : $AB=AC$ و $\left(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB}\right)=\frac{\pi}{3}$	0.25×2	
	ب) ABC مثلث متقايس الأضلاع	0.25	
	3) $z_D=-\sqrt{3}-\sqrt{3}i$	0.25	
	4) أ- T تشابه مركزه A ونسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{3\pi}{4}$	0.25×3	
	ب- ToT تشابه مركزه A ونسبته 2 وزاويته $\frac{3\pi}{2}$	0.5	
المستقيمات والمستويات في الفضاء تطبيقات الجداء السلمي في الفضاء	**التمرين الثاني** (04.5 نقطة)		04.5
	1)-أ- $\overrightarrow{AB}$ لا يوازي $\overrightarrow{AC}$ ومنه النقط A ، B و C تعيّن مستويا.....	0.75	
	ب- $\vec{n}.\overrightarrow{AB}=0$ و $\vec{n}.\overrightarrow{AC}=0$ و منه $\vec{n}$ شعاع ناظمي لـ (ABC)	0.25×2	
	$3x+4y-2z+1=0$ معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).....	0.5	
	2)-أ- $\vec{n}$ شعاع ناظمي لـ (P_1) و $\overrightarrow{n'}(2;-2;-1)$ شعاع ناظمي لـ (P_2)	0.25×2	
	و $\vec{n}\cdot\overrightarrow{n'}=0$ ومنه (P_1) و (P_2) متعامدان.		
	ب- $t\in\mathbb{R}$ $\begin{cases}x=\frac{4}{7}t+\frac{1}{7}\\y=\frac{1}{14}t-\frac{5}{14}\\z=t\end{cases}$ وكذلك $\begin{cases}x=8t\\y=t-\frac{3}{8}\\z=14t-\frac{1}{4}\end{cases}$ تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ)	0.25×3	
	ج- التحقق $O\notin(\Delta)$	0.25×2	
	د- $d\left(O;(P_1)\right)=\frac{\sqrt{29}}{29}$ ، $d\left(O;(P_2)\right)=\frac{1}{3}$	0.25×2	
	$d\left(O;(\Delta)\right)=\sqrt{\frac{38}{261}}$	0.25×2	

140

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
المتتاليات الحسابية	**التمرين الثالث:** (04 نقاط)		
	1) $d=6$ ، $U_3=12$ و $U_5=18$ ، $U_0=3$	0.25×3+0.5	
	2) $U_n=3+3n$ و $2010=3+3\times669$ ورتبته 670	0.75	
	3) $10080=\frac{5}{2}(u_N+u_{N+4})$ ومنه $u_N=2010=u_{669}$	0.5	4
	4) أ) $S=3(n+1)(2n+1)$	0.5	
	ب) $S_1=3(n+1)^2$ و $S_2=3n(n+1)$	0.5×2	
دراسة دالة أسية البرهان بالتراجع معادلة المماس حساب المساحات	**التمرين الرابع:** (07 نقاط)		
	1)أ) $f'(x)=(3x+7)e^x$	0.25	
	$f''(x)=(3x+10)e^x$	0.25	
	البرهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن:		
	$f^{(n)}(x)=(3x+3n+4)e^x$	0.75	
	ب) $y=(3x+10)e^x+c_1x+c_2$ حيث : $(c_1;c_2)\in\mathbb{R}^2$	0.25	
	2)-أ- $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=3\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x+4\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$	0.25	
	$y=0$ معادلة المستقيم المقارب لـ (C_f) عند $-\infty$	0.25	
	ب- إشارة f'، f متزايدة تماما على $\left[\frac{-7}{3};+\infty\right[$ ومتناقصة تماما على $\left]-\infty;\frac{-7}{3}\right]$	0.25×3	
	جدول التغيرات	0.5	07
	3)-أ) معادلة (Δ) : $y=-(3x+16)e^{-\frac{10}{3}}$	0.5	
	ب) إشارة $f''(x)$ ، $\omega\left(-\frac{10}{3};f(-\frac{10}{3})\right)$ نقطة انعطاف	0.25×2	
	ج) رسم (c_f) و (Δ)	0.75	
	4)-أ- $\int_{-1}^{x}te^t dt=(x-1)e^x+\frac{2}{e}$	0.75	
	F دالة أصلية لـ f : $F(x)=(3x+1)e^x+c$	0.5	
	ب- $A(\lambda)=-\int_{\lambda}^{-\frac{4}{3}}f(x)dx=(3\lambda+1)e^{\lambda}+3e^{-\frac{4}{3}}(ua)$	0.5	
	$\lim\limits_{\lambda\to-\infty}A(\lambda)=3e^{-\frac{4}{3}}\ (ua)$	0.25	

141

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
الموافقات نظام التعداد القسمة الاقليدية	**التمرين الأول:** (04 نقاط)		04
	1) $(x,y)=(7k+1,13k+2)$ حيث $k\in\mathbb{Z}$	0.75	
	2) $a=91k+13$ ، $k\in\mathbb{Z}$	0.75	
	3) بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 7	0.75	

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي القسمة	1	2	4

بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 13 ..... 0.75

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي القسمة	1	9	3

4) $b=6+8\times9+\beta\times9^3+\alpha\times9^6$ مع $0<\alpha<9$ و $0\le\beta<9$ 0.25

$b\equiv0[7]$ تكافئ $\alpha+\beta\equiv-1[7]$ 0.25

$b\equiv0[13]$ تكافئ $\alpha+\beta\equiv0[13]$ 0.25

ومنه $\alpha+\beta=13$ وعليه : $(\alpha,\beta)\in\{(5,8),(8,5),(6,7),(7,6)\}$ 0.25

التمثيل الوسيطي لمستقيم معادلة مستو مركز ثقل مثلث بعد نقطة عن مستقيم	**التمرين الثاني:** (05 نقاط)		05
	1) (D) : $\begin{cases}x=1-t\\y=t\\z=\frac{3}{2}t\end{cases}$ ، $t\in\mathbb{R}$ و (Δ) : $\begin{cases}x=\frac{1}{2}\lambda\\y=\lambda\\z=3-3\lambda\end{cases}$ ، $\lambda\in\mathbb{R}$	0.5×2	
	(D) و (Δ) متقاطعان في النقطة $G\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3};1\right)$	0.5	
	2) $\overline{GA}+\overline{GB}+\overline{GC}=\vec{0}$	0.5	
	G مركز ثقل المثلث ABC	0.25	
	3) $\vec{n}\left(1;\frac{1}{2};\frac{1}{3}\right)$ أو $\vec{n}(6;3;2)$	0.5	
	$x+\frac{1}{2}y+\frac{1}{3}z-1=0$ معادلة للمستوى (ABC)	0.5	
	4) المسافة بين النقطة O والمستوي (ABC) تساوي : $\frac{6}{7}$	0.5	
	5) أ- $H\left(\frac{5}{17};\frac{12}{17};\frac{18}{17}\right)$	0.75	
	ب- المسافة بين B و (D) تساوي : $BH=\frac{\sqrt{833}}{17}=\frac{7}{\sqrt{17}}$	0.5	

142

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
الأعداد المركبة المتتاليات	**التمرين الثالث:** (04 نقاط)		
	1/ أ) خطأ، لأن $a=\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$	0.5	
	ب) صحيح لأن: $a^{2011}=\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\overline{a}=-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	
	2/ أ- خطأ لأن زاويته هي $\frac{3\pi}{4}$	0.5	
	ب- خطأ لأنه مجموعة النقط M هي نصف مستقيم مفتوح مبدؤه: A	0.5	04
	3/ أ) صحيح لأن: $\frac{3}{4}\left[-\frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^n+\frac{2}{3}\right]+\frac{1}{6}=-\frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}+\frac{2}{3}$	0.5	
	ب) خطأ لأن: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}-u_n>0$	0.5	
	ج) خطأ لأن: $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\frac{2}{3}$	0.5	
دالة لوغاريتمية دوال أصلية وحساب المساحات الوضع النسبي	**التمرين الرابع:** (07 نقاط)		
	1)-أ- $g'(x)=2x+\frac{2}{x}>0$، g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$	0.25×2	
	$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}g(x)=-\infty$ ، جدول التغيرات.....	0.25×3	
	ب- $g(1)=0$	0.25	
	إشارة $g(x)$: $g(x)>0$ من أجل $x>1$ و $g(x)<0$ من أجل $0<x<1$	0.5	
	2)-أ- f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ لأنها جداء دالتين قابلتن للاشتقاق	0.25	
	$f'(x)=\frac{g(x)}{x^3}$	0.5	
	f متزايدة تماما على $]1;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0;1[$	0.25	
	$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ ، جدول التغيرات	0.25×3	07
	ب- $f(x)-\ln x=\frac{-\ln x}{x^2}$ ومنه (C_f) فوق (δ) من أجل $0<x<1$ و (C_f) تحت (δ) من أجل $x>1$	0.25×2	
	$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2}\ln x=0$	0.25	
	نستنتج أن (δ) منحنى مقارب لـ (C_f) في جوار $+\infty$	0.25	
	رسم (C_f) و (δ)	0.75	
	3)-أ- $\int_1^x\frac{1}{t^2}\ln t\,dt=-\frac{1}{x}(1+\ln x)+1$	0.5	
	$x\mapsto x\ln x-x$ هي دالة أصلية لـ $x\mapsto\ln x$ على $]1;+\infty[$	0.25	
	F دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$ $F(x)=\frac{(x^2+1)\ln x-x^2+1}{x}$	0.25	
	ب- $A(\alpha)=\int_1^{\alpha}(\ln x-f(x))dx=1-\frac{1+\ln\alpha}{\alpha}(ua)$	0.25	
	$\lim\limits_{\alpha\to+\infty}A(\alpha)=1\,(ua)$	0.25	

143